VETERINARY HPM®

ADULT NEUTERED

INDIKATIONEN

Alleinfuttermittel für **ausgewachsene Katzen**
- Für **kastrierte** Katzen ab **1 Jahr**

PACKUNGSGRÖSSEN

1,5 kg, 3 kg, 7 kg, 12 kg

Ca. 10,5 x 5,5 mm

Dieses Futter berücksichtigt den veränderten Ernährungsbedarf ausgewachsener Katzen nach der Kastration. Die Rezeptur unterstützt die Gewichtskontrolle durch eine niedrige Energiedichte, einen erhöhten Faseranteil und einen hohen Proteingehalt.

GLOBAL PREVENTIVE PROFILE

Gewichtskontrolle

Der niedrige Energiegehalt der Nahrung, das Energiegleichgewicht (Protein:Fett:Kohlenhydrate) und angepasste Tagesrationen begrenzen die Kalorienaufnahme. Der erhöhte Fasergehalt fördert die Sättigung. L-Carnitin begrenzt die Bildung von Fettgewebe.

Gesunde Harnwege

Der hohe Gehalt an tierischen Proteinen stimuliert die Trinkwasseraufnahme, erhöht dadurch das Harnvolumen und unterstützt die Stabilisierung des Harn-pH-Wertes für die Gesunderhaltung des Harnsystems.

Unterstützung von Haut & Fell

Der hohe Gehalt an tierischen Proteinen (reich an schwefelhaltigen Aminosäuren) und der ausgewogene Gehalt an essenziellen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren fördern die epidermale Barrierefunktion und verbessern die Talgqualität für eine gesunde Haut und ein glänzendes Fell

Haarballenkontrolle

Eine spezifische Mischung aus Fasern (unlöslich und löslich) reguliert die Magen-Darm-Passage und unterstützt die Begrenzung der Haarballenbildung.

Maulhöhlen- und Zahngesundheit

Der Zusatz von *Ascophyllum nodosum* unterstützt die Begrenzung von Plaque- und Zahnsteinbildung, reduziert Halitose und trägt zur Aufrechterhaltung einer guten Maulhöhlen- und Zahngesundheit bei.

Zusätzliche Gesundheitsvorteile

- Unterstützung der Nierenfunktion
- Hohe Verdauungstoleranz

SCIENTIFICALLY PROVEN

KÖRPERZUSAMMENSETZUNG

5 MONATE NACH KASTRATION IMMER NOCH IDEAL (1)

TRINKWASSERAUFNAHME

35 % SIGNIFIKANT ERHÖHT IM VERGLEICH ZU EINER REFERENZ-TROCKENNAHRUNG FÜR ADULTE KATZEN MIT NIEDRIGEREM PROTEIN- UND NATRIUMGEHALT (2)

NIERENSICHERHEIT

40 MONATIGE BEOBACHTUNG — KEIN NEGATIVER EFFEKT AUF RENALE BIOMARKER (3)

(1) A. André et al. A high protein intake allows the preservation of lean mass and prevents the increase of fat mass, compared to a moderate protein intake, in neutered cats. ASAS Congress 2015
(2) I.Leriche et al. Effect of a dry diet composition on water intake in cats. ESVCN Congress 2014
(3) I Leriche, et al. Forty month-follow up of renal function in cats fed a high-protein diet. SEVC Congress 202

CAT

KARNIVOREN-ERNÄHRUNG

in % der Original-substanz

VIEL PROTEIN	44 %
TIERISCHEN URSPRUNGS	90 %
WENIG KOHLENHYDRATE	20,5 %

ZUSAMMENSETZUNG

Dehydratisierte Schweine- und Geflügelproteine, Reis, hydrolysierte Schweine- und Geflügelproteine, Lignocellulose, Erbsen, Geflügelfett, Erbsenfaser, Mineralstoffe, Leinsamen, inaktivierte Bierhefe, getrocknete (Zucker-)Rübenschnitzel, Seealgenmehl (*Ascophyllum nodosum*), Fructo-Oligosaccharide, Flohsamenfaser (*Plantago (L.)* spp.), Chitosan aus Krustentieren, inaktivierter *Lactobacillus helveticus*.

ANALYTISCHE BESTANDTEILE (in % der Originalsubstanz)

Feuchtigkeit	5,5
Rohprotein	44
Verhältnis tierische/pflanzliche Proteine (%)	90/10
Rohfett	13,5
Mineralstoffe/Rohasche	8,5
Rohfaser	8
Gesamtfasern	12,5
NfE*	20,5
Stärke	14
Kalzium	1,3
Phosphor	1,1
Ca/P-Verhältnis	1,2
Natrium	0,7
Omega-6-Fettsäuren	2,4
Omega-3-Fettsäuren	0,8

SPEZIFISCHE ZUSATZSTOFFE

Bentonit (%)	0,5
Lactobacillus (mg/kg)	7
Ascophyllum nodosum (%)	0,6
L-Carnitin (mg/kg)	540
Chitosan (mg/kg)	800

FÜTTERUNGSTABELLE

Körper-gewicht (kg)	Tagesration (g/Tag)		
	Leichte Gewichts-reduktion	Nur Indoor	Indoor & Outdoor
2	21	25	25
3	32	35	40
4	42	45	55
5	53	60	65
6	63	70	80
7	74	85	90
8	84	95	105
9	95	105	120
10	105	120	130

Bei den angegebenen Mengen handelt es sich um Richtwerte, die je nach Rasse und körperlicher Aktivität variieren können.

NÄHRWERTANGABEN

ME** (berechnet) (kcal/100 g)***	364
PCR (g/Mcal)***	121
Energie aus Rohprotein (%)	45
Energie aus Fett (%)	34
Energie aus NfE*(%)	21

* N-freie Extraktstoffe
** Metabolisierbare Energie
*** Protein/Kalorien-Verhältnis. Berechnet nach NRC 2006